

北海道消化器科病院（食道癌）

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与日 | 1クール |
|----------------------|------------|-----------------------|----------------------|--------|
| DCF | DTX | 70mg/m ² | D1 div | 21日 |
| | CDDP | 70mg/m ² | D1 div | |
| | 5-FU | 750mg/m ² | D1-5 div | |
| DTX | DTX | 70mg/m ² | D1 div | 21日 |
| FP (FU800/CDDP80) | CDDP | 80mg/m ² | D1 div | 21/28日 |
| | 5-FU | 800mg/m ² | D1-5 div | |
| FP-RT(Stage I) | CDDP | 70mg/m ² | D1 div | 28日 |
| | 5-FU | 700mg/m ² | D1-4 div | |
| | RT | 60Gy/30fr | D1-30 RT | |
| FP-RT(Stage II/III) | CDDP | 75mg/m ² | D1 div | 28日 |
| | 5-FU | 1000mg/m ² | D1-4 div | |
| | RT | 50.4Gy/28fr | D1-28 RT | |
| mFOLFOX6 | L-OHP | 85mg/m ² | D1 div | 14日 |
| | I-LV | 200mg/m ² | D1 div | |
| | 5FU(bolus) | 400mg/m ² | D1 bolus | |
| | 5FU(ci) | 2400mg/m ² | D1-2 ci | |
| NDP/5FU | NDP | 90mg/m ² | D1 div | 28日 |
| | 5-FU | 800mg/m ² | D1-5 div | |
| PTX (6投2休) | PTX | 100mg/m ² | D1,8,15,22,29,36 div | 56日 |
| オブジーボ (Q2W) +ヤーボイ | NIVO | 240mg/body | D1,15,29 div | 42日 |
| | IPI | 1mg/kg | D1 div | |
| オブジーボ (Q3W) +ヤーボイ | NIVO | 360mg/body | D1,22 div | 42日 |
| | IPI | 1mg/kg | D1 div | |
| オブジーボ (Q2W) +FP | NIVO | 240mg/body | D1,15 div | 28日 |
| | CDDP | 80mg/m ² | D1 div | |
| | 5-FU | 800mg/m ² | D1-5 div | |
| オブジーボ (Q4W) +FP | NIVO | 480mg/body | D1 div | 28日 |
| | CDDP | 80mg/m ² | D1 div | |
| | 5-FU | 800mg/m ² | D1-5 div | |
| オブジーボ240 (Q2W) | NIVO | 240mg/body | D1 div | 14日 |
| オブジーボ480 (Q4W) | NIVO | 480mg/body | D1 div | 28日 |
| オブジーボ240術後 (Q2W) | NIVO | 240mg/body | D1 div | 14日 |
| オブジーボ480術後 (Q4W) | NIVO | 480mg/body | D1 div | 28日 |
| キイトルーダ+FP | PEMB | 200mg/body | D1 div | 21日 |
| | CDDP | 80mg/m ² | D1 div | |
| | 5-FU | 800mg/m ² | D1-5 div | |
| キイトルーダ200 (Q3W) | PEMB | 200mg/body | D1 div | 21日 |
| キイトルーダ400 (Q6W) | PEMB | 400mg/body | D1 div | 42日 |